


# MOSIAC capsule apribili Lattoferrina 200 mg



*Vademecum*



Ogni capsula di Mosiac contiene 200 mg di Lattoferrina bovina



MOSIAC® contiene lattoferrina bovina riconosciuta dalla Food and Drug Administration (FDA,USA) priva di effetti avversi e classificata come integratore alimentare.

Le preparazioni di lattoferrina contenute in Mosiac sono **sature in ferro dal 5 al 10%**, hanno un **grado di purezza pari al 99%**, sono integre, prive di frammenti di degradazione e attive al 99%.



# Dosaggi consigliati nella prevenzione e nel trattamento del COVID-19

## PREVENZIONE

Per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 si consiglia di assumere preferibilmente due capsule al giorno: una capsula contenente 200 mg di Lattoferrina alle ore 11:00 e un'altra alle ore 17:00.  
Il trattamento può essere prolungato per mesi.

## TRATTAMENTO DI SOGGETTI ASINTOMATICI

Ai pazienti positivi al coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ma asintomatici, si consiglia di assumere immediatamente dopo la risposta del tampone molecolare, 3 capsule al giorno: una capsula contenente 200 mg di Lattoferrina alle ore 11:00, un'altra alle ore 17:00 ed un'altra alle ore 23:00.

**Se si dovessero manifestare sintomi, come la febbre o la perdita dell'olfatto, si consiglia di aumentare immediatamente da 3 a 5 capsule al giorno:** preferibilmente due capsule contenenti 200 mg di Lattoferrina alle ore 11:00, una capsula alle ore 17:00 e due alle ore 23:00.

Il trattamento può essere interrotto alla negativizzazione del tampone

## **TRATTAMENTO DI SOGGETTI PAUCISINTOMATICI**

Ai pazienti positivi al coronavirus 2 (SARS-CoV-2) paucisintomatici o mediamente sintomatici (tosse secca, raffreddore, febbre, perdita dell'olfatto e del gusto), si consiglia di assumere 5 capsule al giorno: due capsule contenenti 200 mg di Lattoferrina alle ore 11:00, una alle ore 17:00 e due alle ore 23:00

Se il paziente pesa più di 70 Kg, si consiglia di assumere 6 capsule al giorno: due capsule contenenti 200 mg di Lattoferrina alle ore 11:00, due alle ore 17:00 e due alle ore 23:00.

Nei pazienti paucisintomatici trattati con Lattoferrina i sintomi scompaiono entro 3-5 giorni. In soggetti paucisintomatici non trattati invece i sintomi si prolungano per più giorni.

**Mosiac va sempre assunto lontano dai pasti.**

**Mosiac deve essere assunto anche dopo la scomparsa dei sintomi fino a negativizzazione del tampone.**

**Mosiac non sostituisce ma integra qualsiasi terapia farmacologica.**

Campione  
Mirabelli  
Naidu